

¿QUE ES LA DIROFILARIASIS?

La dirofilariasis, filariasis o filariasis cardíaca es una enfermedad que causa obstrucción en el corazón y sus principales vasos sanguíneos, ocasionada por un parásito que es transmitido por la picadura de un mosquito.

¿QUE DAÑOS OCASIONA ESTE PARÁSITO A MI MASCOTA?

La presencia de las larvas adultas de este parasito ocasiona:

- Enfermedad vascular pulmonar.
- Hipertensión pulmonar.
- Enfermedad cardíaca.
- Enfermedad pulmonar.
- Glomerulonefritis.

¿COMO SE INFESTA MI MASCOTA DE DIROFILARIASIS?

Las mascotas perros y gatos se infestan al recibir la picadura de zancudos infestados que hayan picado animales enfermos de dirofilariasis; los animales enfermos tienen en su sangre larvas del parásito muy pequeñas llamadas microfilarias que son absorbidas por el zancudo al momento de la picadura. Aunque la infestación con este parásito ocasiona una enfermedad muy grave, muchos animales pueden ser asintomáticos (sin síntomas de enfermedad) por un tiempo mayor de un año. Por ser Venezuela un país tropical, el zancudo transmisor de la enfermedad se encuentra disperso en una amplia zona del territorio nacional. Por lo tanto cualquier perro que viaje con frecuencia a zonas por debajo de los 600 m.s.n.m. (metros sobre el nivel del mar) debe recibir medicamentos para protegerse efectivamente de la picadura del zancudo y de la microfilaria transmitida por la picadura.

¿CUALES SON LOS SIGNOS DE LA ENFERMEDAD?

- Tos no productiva (sin flema)
- Dificultad respiratoria
- El perro se cansa rápido al hacer ejercicio o simplemente se rehúsa a salir para caminar.
- Desmayos por ejercicio súbito o agitación.
- Abdomen aumentado de tamaño.
- Hemorragias nasales.
- Inapetencia. y debilidad.

ESTOS SON SIGNOS QUE SE PRESENTAN EN OTRAS ENFERMEDADES POR LO TANTO LA ÚNICA FORMA DE ESTAR SEGUROS ES LLEVANDO NUESTRA MASCOTA AL MEDICO VETERINARIO, LA PRESENCIA DEL PARÁSITO SE PUEDE DETERMINAR MEDIANTE UN EXAMEN ESPECIAL EN LA SANGRE.

¿CÓMO PUEDO PROTEGER A MI MASCOTA?

Su médico veterinario le explicará cuales son las medidas de protección necesarias así como la frecuencia de administración de los medicamentos preventivos. Actualmente existen medicamentos orales, aplicados sobre la piel o inyectados. Por lo general la administración de estos medicamentos debe ser repetida cada 30 días si el paciente lo amerita y bajo indicación del Médico Veterinario.

¿QUÉ MÁS DEBERÍA SABER?

Es falso que la enfermedad sea transmitida solo a los perros que van a la playa, esta enfermedad está presente en todo el país por debajo de los 600 m.s.n.m. (metros sobre el nivel del mar). En aquellos casos en que los resultados de la prueba de sangre sean negativos y ante la persistencia se los signos de enfermedad se indica la realización de pruebas complementarias.

